



Teulere pied sauvage



OMTP1323



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1323

Vass2R01s451-455

OMtp 1323
TEULERE PIED SAUVAGE (vri)
LAMBRUSQUE VRAIE (= Nom var.)
2R01s 451-455

OMtp1323

Date : 22.7 2014

Personne : *LP*

Nb feuille : *3*

divers

Lambrusque vraie

Teulere pied sauvage

Vass2R01s451-455





| Formulaire description 2 / 8 (stade floraison) | | | Emplacement |
|--|------|-------------|------------------------------|
| Nom variété | Code | Observateur | Remarques Pour A. Lounay. |
| Nom Accession | Code | Date | |
| Teulère pied sauvage 011p1323 | | | |

BOURGEONNEMENT

| Code OIV | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|-----------|---|---------------------|--------------|----------------|-------|------------|
| 001 = (2) | Ouverture extrémité | fermée | demi-ouverte | compl. ouverte | | |
| 002 | Distribution pigm. anthocyan. poils couchés extrémité | 1-absente | 2- en liseré | 3-partout | | |
| 003 = 4 | Intensité pigm. anthocyan. poils couchés extrémité | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 004 = 3 | Densité des poils couchés de l'extrémité | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 005 = 5 | Densité poils dressés de l'extrémité | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |

JEUNES FEUILLES (4^{ème} feuille détachée)

| Code OIV | Descripteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|---|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 051 = (6) | Couleur face supérieure limbe + ocw | 1- verte vert-jaune | 2- jaune vert plag. antho | 3- bronzées rg. cuivr. clair | 4. cuivr.-roug. rg. cuivr. clair | rg. vineux |
| 053 = 7 | Densité poils couchés entre nerv. principales face inf. | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 054 | Densité poils dressés entre nerv. principales face inf. | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 055 | Densité poils couchés sur nerv. principale face inf. | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 056 = 8 | Densité poils dressés sur nerv. principales face inf. | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |

RAMEAU HERBACE

| Code OIV | Descripteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 006 = 9 | Port | érigé | demi érigé | horizontal | demi-retomb | retombant |
| 351 | Vigueur du rameaux | très faible | faible | moyen | forte | très forte |
| 352 | Croissance prompt-bourgeons | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 007 = 10 | Couleur face dorsale entrenœuds | 1- verte | 2- verte et rouge | 3- rouge | | |
| 009 = 12 | Couleur face dorsale nœuds | 1- verte | 2- verte et rouge | 3- rouge | | |
| 008 = 11 | Couleur face ventrale entrenœuds | 1- verte | 2- verte et rouge | 3- rouge | | |
| 010 = 13 | Couleur face ventrale nœuds | 1- verte | 2- verte et rouge | 3- rouge | | |
| 014 | Densité poils couchés entrenœuds | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 013 | Densité poils couchés nœuds | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 012 = 14 | Densité poils dressés entrenœuds | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 011 | Densité poils dressés nœuds | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 015-2 | Intensité pigm. anthocyan. écailles des bourgeons | nulle / très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 016 | Distribution vrilles | 1- 2 ou moins | 2- 3 ou plus | | | |
| 017 = 15 | Longueur vrilles + valeur absolue (en cm) = | très courtes (<10 cm) | courtes (15 cm) | moyennes (20 cm) | Longues (25 cm) | très longues (>30 cm) |
| 000-42 | Relief surface du rameau herbacé | 1- unie | 2- côtelée | | | |
| 000-10 | Villosité spéciale du rameau herbacé | 1- épines | 2- p. massifs | 3- aucune | | |
| 000-21 | Couleur des vrilles | 1- jaune | 2- rouge clair | 3- rg. foncé | 4- vert | |

INFLORESCENCE

| Code OIV | Descripteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|
| 151 = 16 | Sexe de la fleur | 1- mâle | 2- mâle à herm. | 3- hermaphrodite | 4- femelle | |
| 152 | Niveau insertion 1 ^{re} inflorescence | 1- jusqu'au 2 ^o nœud | 2- 3 ^o et 4 ^o nœud | 3- à partir du 5 ^o nœud | | |
| 153 | Nombre inflorescence/rameau | 1- 1 ou moins | 2- 1,1 à deux | 3- 2,2 à trois | 4- plus de trois | |
| 155 | Fertilité bourgeons de la base | très faible | | moyenne | | t. élevée |
| 501 | Taux de nouaison | très faible (<10%) | faible (20%) | moyen (40%) | élevé (60%) | tr. élevé (=>80%) |
| 000-43 | Taille du bouton floral | 1- petit | 2- moyen | 3- gros | | |
| 302 | Epoque de floraison + date absolue = | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |

| | | | | |
|--------------------|-----------|----------|------------|------------|
| INRA Vassal | Virus ENR | Mildiou | Esca | Chlorose |
| Codes OIV 2009 | Virus CN | Oïdium | Eutypiose | Carence Mg |
| (= OCVV 2013) | Autre | Botrytis | Excrosiose | Autre |
| Codes 000-internes | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Formulaire description 4 / 8 (nouaison-véraison) | | Emplacement |
| Nom variété / introduction TEULERE PIED SAUVAGE | | Remarques <i>pour Amandine</i> |
| Observateur - Date | Code var / intro 011p 1323 | |

LIMBE

| Code OIV | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|----------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 065 = 17 | Taille du limbe | très petite | <u>petite</u> | moyenne | grande | très grande |
| 067 = 18 | Forme du limbe | 1-cordiforme | <u>2-cunéiforme</u> | 3-pentagon. | 4-orbicul. | 5-rénif. |
| 068 = 20 | Nombre de lobes | 1-F. entière | <u>2-trois</u> | 3-cinq | 4-sept | 5- + de sept |
| 069 | Couleur face supérieure limbe | | vert clair | vert moyen | <u>vert foncé</u> | |
| 070 = 27 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe | <u>1- nulle</u> | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc. |
| 071 | Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe | <u>1- nulle</u> | 2- seulement au point pétiole | 3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- jusqu'à 2 ^{ème} bifurc. | 5- au-delà de la 2 ^{ème} bifurc. |
| 074 | Profil du limbe | <u>1-plan</u> | 2-en V | 3-involuté | 4-révoluté | 5-tourmenté |
| 073 | Ondulation du limbe (entre nervures I ou II) | <u>absente</u> | | | <i>un peu</i> | présente |
| 072 | Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II) | <u>absente ou t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| 075 = 19 | Cloûre de la face sup. du limbe (entre nerv. dernier ordre) | nulle à t. fb. | faible | <u>moyenne</u> | forte | très forte |
| 084 = 28 | Densité p. couchés entre nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | <u>moyenne</u> | forte | très forte |
| 085 | Densité p. dressés entre nerv. face inf. | <u>nulle à t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| 086 | Densité p. couchés des nerv. face inf. | nulle à t. fb. | faible | <u>moyenne</u> | forte | très forte |
| 087 = 29 | Densité p. dressés des nerv. face inf. | <u>nulle à t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| 088 | Villosité couchée nerv. principales face sup | <u>absente</u> | | | | présente |
| 089 | Villosité dressée nerv. principales face sup | <u>absente</u> | | | | présente |
| 000-44 | Densité p. couchés limbe face sup. | nulle à t. fb. | <u>faible</u> | moyenne | forte | très forte |
| 000-45 | Densité p. dressés limbe face sup. | <u>nulle à t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |

PETIOLE

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------|
| 090 | Densité poils couchés sur le pétiole | <u>nulle à t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| 091 | Densité poils dressés sur le pétiole | <u>nulle à t. fb.</u> | faible | moyenne | forte | très forte |
| 093 = 30 | Longueur pétiole p/r nervure médiane | plus court | légér. plus court | <u>égal</u> | légér. plus long | plus long |
| 000-06 | Couleur du pétiole | 1 - coloré | <u>2 - partiel coloré</u> | 3 - vert | | |

SINUS PETIOLAIRE (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 079 = (23) | Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole | <u>très ouvert</u> | ouvert | fermé | chevauchant | très chev. |
| | +ocvv | <u>très larg. ouvert</u> | <u>demi-ouvert</u> | <u>peu ouvert</u> | <u>légér. chev.</u> | <u>très fort. chev</u> |
| 080 | Forme de la base du sinus pétiole | 1- en U | 2- en accolade | <u>3- en V</u> | | |
| 081-1 | Dent dans la sinus pétiole | <u>absents</u> | | | | présents |
| 081-2 | Base du sinus pétiole limité par la nervure | <u>1- non limité</u> | 2- sur un côté | 3- sur les deux côtés | | |

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 082 = (22) | Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs | <u>1- ouverts</u> | 2- fermés | 3- légèrement chevauchants | 4- très chevauchants | 5- absence de sinus |
| 094 = 21 | Profondeur des sinus latéraux supérieurs | absence ou très peu profond | <u>peu profond</u> | moyens | profonds | très profonds |
| 083-1 | Forme de la base des sinus latéraux supérieurs | <u>1- en U</u> | 2- en accolade | 3- en V | | |
| 083-2 | Dent dans les sinus latéraux supérieurs | <u>absentes</u> | | | | présents |

DENTS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 076 = 26 | Forme des dents | 1- à deux côtés concaves | 2- à deux côtés rectilignes | <u>3- à deux côtés convexes</u> | 4- un c. concaves, un c. convexes | 5- mélange notation 2 et notation 3 |
| 077 = ((24)) | Taille des dents par rapport à la taille du limbe | très petites | petites | <u>moyennes</u> | grandes | très grandes |
| 078 = 25 | Longueur des dents par rapport à leur largeur | <u>très courtes</u> | courtes | moyennes | longues | très longues |

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Oiv 501 | Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.) | très faible (<10%) | faible (11-30%) | moyen (31-50%) | élevé (51-70%) | très élevé (>80%) |
| 303 = 31 | Epoque de début de véraison | très précoce | précoce | moyenne | tardive | très tardive |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| INRA Vassal | Virus ENR | Mildiou | Esca | Chlorose |
| Codes OIV 2009 (= OCVV 2013) | Virus CN | Oïdium | Eutypiose | Carence Mg |
| Codes 000-internes | Autre | Botrytis | Exciosiose | Autre |

Formulaire description 6 / 8 (après chute des feuilles)

Emplacement

2R10451-455

Nom variété / introduction

TEULERE PIED SAUVAGE

Remarques

Pour Ammandine

Observateur - Date

TL 2017

Code var / intro

OMP 1323

SARMENT

| Code OIV | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 101 | Section circulaire | 1 - circulaire | 2 - elliptique | 3 - aplatie | | |
| 102 | Relief de la surface | 1 - uni | 2 - côtelé | 3 - strié | | |
| 103 = (44) | Couleur générale + OCVV | 1 - jaune brun orangé | 2 - brunâtre brun foncé | 3 - rouge violacé brun violacé | 4 - gris | |
| 104 | Lenticelles | absentes | | | | présentes |
| 105 | Poils dressés des nœuds | absents | | | | présents |
| 106 | Poils dressés des entrenœuds | absents | | | | présents |
| 351 | Vigueur du rameau * | très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 352 | Croissance des prompts-bourgeons | absence ou très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 353 | Longueur des entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 110 | très courts (< 60 mm) | courts (90 mm) | moyens (120 mm) | longs (150 mm) | très longs (> 150 mm) |
| 354 | Diamètre des entrenœuds Valeur absolue (en mm) : 7 | très petits (< 5 mm) | petits (8 mm) | moyens (11 mm) | grands (14 mm) | très grands (> 17 mm) |

SARMENT (SUPPLEMENT POUR PORTE-GREFFES)

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|---------|-------|------------|
| 551 | Rendement en bois / ha | très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 552 | Formation du cal de soudure | très faible | faible | moyenne | forte | très forte |
| 553 | Aptitude à la rhizogenèse | très faible | faible | moyenne | forte | très forte |

SARMENT (SUPPLEMENT VASSAL)

| | | | | |
|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 000-47 | Epaisseur des nœuds par rapport aux mérithalles | 1- aplatis | 2- moyens | 3- saillants |
| 000-48 | Pruine sur le sarment | 1- absence | 2- partiellement présente | 3- présente |

* Voir également le formulaire 1/8 « Phénologie et vigueur »

INRA Vassal

 Codes OIV 2009
(= OCVV 2013)
Codes 000-internes

 Virus ENR
Virus CN
Autre

 Mildiou
Oïdium
Botrytis

 Esca
Eutypiose
Excrosiose

 Chlorose
Carence Mg
Autre

JPP

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 8501 CodeIntro : 0Mtp1323

Nom Var : Teulere pied sauvage

Emplacement : Vass2R01s451-455

PHENOLOGIE

| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---------|---|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| Oiv 301 | époque du bourgeonnement | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 302 | époque de floraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 303 | époque de véraison | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 304 | maturité physiologique de la baie | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 305 | début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) | très précoce | précoce | Moyenne | tardive | très tardive |
| Oiv 306 | coloration des feuilles en automne | Jaune | Rougeâtre | Rouge | Rouge foncé | rouge violet |

VIGUEUR ET CROISSANCE

| | | | | | | |
|---------|---|------------------------|--------|---------|-------|------------|
| Oiv 351 | vigueur rameaux (floraison) | très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 352 | croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) | absent ou très faible. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

RESISTANCE

| | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|
| Oiv 459 | Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe | | très faible ou faible | moyenne | | élevée ou très élevée |
|---------|--|--|-----------------------|---------|--|-----------------------|

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 7 | | 22/3 | 7 | |
| 2 | 2 | | 22/3 | 0 | |
| 3 | 2 (F) | | 22/3 | 0 | |
| 4 | Tf(1) | | | | |
| 5 | 8 | | 23/3 | 6 | |
| Moyenne | 17 | | 22/3 -2 | 13 | 8 |

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 03/06 -2 | | que des grappes (2) 12/08 | 19/08 +4 | 20-09 +1 | |

SUIVI DE MATURITE

| Dates | 30-08 | 06-09 | 12-09 | 20-09 |
|------------------|-------|-------|-------------|-------------|
| IR | 17 | 22 | 23 ? | à vide ?! |
| Valeur papier PH | | | pulpe acide | peau sucrée |

Remarque :

A vu sur rameaux 254